Entero-Epiplomphale. No. 24.

la femme
Jean marillier
employé dans les
Forges de M.
le prince de Conti

Vne femme de la paroisse de Varine le
Chateau en Clermontois diocese de reims,
agée de cinquante Sept ans Etoit incommodée
depuis prés de vingt ans d'vne Suite de Coupe
d'vn Entero Epiplomphale, les parties Sortoient
Souvent et rentroient d'elle même avec facilité,
elle ne Setoit jamais Voulu assujettir à
porter de bandage, et n'avoit jusqu'au
30. Janvier dernier encore connu aucune
Inquiétude Sur Son Etat; mais ce jour
les parties Etant Sorties alord elle voya
Suivant Sa Coutume de les reduire mais
Sans Succes, les douleurs qu'elle ressentit
alors dans la region hypogastrique et la fievre
qui Survint commencerent de l'inquiéter mais
pas assez Sans doute pour demander du Secours,
Enfin le cinquieme jour d'Accident 5. Février dernier prévenu par la douleur je fus appellé à Sept heures du Soir; je la trouvay avec les Symptomes les plus Violents de

ARC 14 d 11 n° 12

L'étranglement, la tumeur qui étoit très
Considérable parraissoit annoncer déjà
par sa couleur livide la pourriture des
parties quelle contenoient, je proposai
l'opération dans linstant comme le seul
moyen de guérir, mais la malade refusa
de s'y soumettre; de ce jour jusqu'au
lendemain, 4. pouces le progrès de la
gangrene fut si rapide, que je trouvai
la tumeur qui étoit encore augmentée,
(encore qu'alors elle étoit comme la pomme
d'un chapeau) absolument livide, les
accidents étoient alors terribles par l'extreme
tension douloureuse, le hoquet, le vomissement
presque continuel meme de matiéres fécales,
des douleurs les plus aigues et qui ne
donnoient pas de relache; dans cette
Extrémité la malade se soumit à
l'opération et je entrepris suivant le
sentiment de celle; ajant donc

ouvert la tumeur, je trouvai tout ce
qu'elle contenoit entierement gangrené
lintestin S'en alloit par lambeau et
donnoit issüe aux matiéres fécales qui
toutes daté de ce jour gravoient par la
glaje, ce qui mingnela le plus, cét que
le pouvoit paroissoit se prolonger
jusque dans la Capacité du bas Ventre,
J'avoue que dans le moment je fus fort
embarrassé, mais m'étant rappellé la
Conduite qu'avoit tenüe autre fois le
Célébre Monsieur de la peyronnie dans
Une circonstance presque Semblable
rapportée par M.r de la faje dans Son
commentaire Sur les opérations de M.r
Dionis; cet Exemple ranima mon courage,
Je Commanday par emporter tout le gloon
Sorty ainsi que les portions de intestin,
les grandes Voisines, et tout les tégumens
qui Enveloppoient ces parties, je nayois

de tirer l'intestin dehors pour reconnoître
jusqu'où se prolongeoit la gangrene,
mais je ne pus en venir about quoique
j'eusse dilaté l'anneau ombilical, je trouvai
au moins sept pouces d'intestin hors d'état
de pouvoir se ranimer et que j'emportai
sur le champ, je ne restai pas sans
inquiétude pour les parties de l'intestin
supérieure et inférieure de la portion
coupée, par ce que la pourriture commençoit
à faire du chemin,
La portion du Mésentere qui répondoit à
celle de l'intestin emporté se trouvant aussi
gangrenée, nous voyant point de ressource
et craignant avec raison que la pourriture
ne gagna tout ce viscere, je me décidai aussi
de l'emporter, ce que je fis ayant la voie libre
au dehors le plus possible, je craignois
l'hemorragie, mais agréablement que

La tête mécatérique étoit affaissée par
la mortification et le ventre, car il y
avoit fort peu de sang.
Je fis l'autopsie mais avec beaucoup de difficulté
deux points d'Equilles pour réunir le
mésentère divisé, et par ce moyen les deux
extrémités de l'intestin séparées par la
perte d'une portion de sa substance se
trouvèrent ainsi rapprochées, je fis à l'exemple
de Mr. de la peyronnie, avec les bouts de fil
deux anses qui restèrent au dehors et
servirent à retenir vers le haut de la
plaie la bouche supérieure de l'intestin,
précaution que je jugeai nécessaire pour
prévenir l'épanchement des matières
fécales dans le bas ventre, j'ai réussi et
l'intestin malgré l'inflammation qui avoit
précédé la mortification, avoit
contracté quelque adhérence avec
l'abdomen
Cette opération faite je fomentai

la plaie avec du vin tiède et la panse
avec un digestif animé, le ventre étant
extrêmement tendu, on fit mettre une
canelle imbibée d'une décoction très
émolliente renouvellée souvent, on donna
des demi lavemens de tems à autre de la
même décoction, on donna une
cuillerée de sirop de capillaire, chiendent
reglisse et un peu de gomme Canelle,
le malade étant fort affoibli, on
lui donna deux cuillerées de vin
vin et de petit bouillon,
Ce regime fut continué jusqu'au six
fevrier matin, pendant ce tems,
la gangrene s'étant fort étendue à
l'extérieure de la plaie dont le fond
étoit toujours noir, j'ay mis plusieurs
cataplasmes du tems Cellulaire fort long
et fus le party de faire des mouchetures
dans toute la circonference de la plaie
elle saignerent un peu, je fis ensuite

à la substance du mésentere parallelle à
la plaie extérieure, moignant le plus
possible des points d'aiguilles, et fit
prendre à la malade pour toute boisson
et dans l'intention de combattre avec succès
la pourriture (que les progrès extérieurs me
faisoient juger être passé dans le sang)
une décoction de kkina ajoutant après
l'ebullition quelques grains de Sel ammoniac.
Delegers cordiaux et de tems à autre un
peu de gelée de C. de Cerf. Arlavement
et fomentations toujours continuées sur le
Ventre qui commençoit un peu à se détendre.
Les choses restèrent à peu près dans cet Etat
jusqu'au huit fevrier que je commençay
à appercevoir que la gangrene alloit se
borner aux tégumens par une apparence
de Cercle qui environnoit la plaie, mais
le fond en étoit encore noire et toute la
jambe paroissoit très affecté, Jusqu'aux extremités

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Supérieure jetirai encore ce jour
plusieurs lambeaux du tissu Cellulaire
et Cutirement couverts; le neuf la
gangrene paroit tout à fait bornée à l'extérieur
le fond de la plaie ainsi que l'intestin
semblent un peu se ranimer; le regime
précédent fut cependant continué jusqu'au
15 février que je connu de grands Espérances
le fond de la plaie étoit devenu vermeil,
l'extrémité Supérieure de l'intestin s'étoit
exfoliée de la même externe que je trouvai
dans la plaie éloignée de près de six
pouces, sans doute que l'extremité
inférieure s'est également exfoliée, mais
moins sensiblement,
De ce jour jusqu'au 20 février les choses
allerent de mieux en mieux, la plaie alors
étoit extrêmement bourgeonnante ainsi que le mésentere
dont les fils qui l'avoient tenu se
détacherent ce même jour, je fis alors

ceux de l'usage du Kkina, les Cordiaux
l'avoient été quatre jours plutôt; et la
malade fit de nouveau usage de la
ptisanne précédente et toujours du gelée de C. de Cerf.
Alors le ventre étoit très mous, plus de fièvre
le pouls bon, la malade dormant bien, et
l'intestin Vermeil; encouragé par ces premiers
succès, j'osai espérer la guérison radicale
de cette malade, et fortifié par l'exemple
de M.r Ramadoré ainsi rapporté par M.r
de la Roche, j'ai rapporté dans l'ouvrage cité plus haut,
j'ai rapproché les deux Extremités de
l'intestin, j'ai fait passer la supérieure dans
l'inférieure et les maintint dans cet état
par le moyen de deux points d'Aiguille, —
trente Six heures après l'opération la plus
grande partie des Excrémens reprirent
leurs cours ordre et il n'y en eut qu'une
petite portion des plus fluides qui passerent
par la plaie. Cela dura jusqu'au 25.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

matin, le quel jour je fut bien etonné
en pansant de trouver l'intestin dehors,
les pointes des guilles s'etant arrachés
et toute le plaie remplie de excréments, —
cependant les extrémités de l'intestin ne
s'etoient pas écartées de lameau, —
et l'état dura jusqu'au 7. mars parce
que la malade ne voulut pas souffrir
que je tantasse de nouveau la réunion
de l'intestin, cependant elle se rendit,
et je l'effectuai le meme jour 7. mars.
l'extrémité inférieure de l'intestin meme
paraissant pas avés vermeil, je le tirai —
vn peu au dehors, et en coupai encore
vn pés dix pouce et demie, parce que je ne
voulois pas mettre à voir manquer
les pointes d'éguilles par la malade —
de cet intestin, je fit comme la
premiere fois passer vne des —

Extrémités dans l'autre, et fit seulement
Vu qu'il devait déguiller pour ces 3 maintenus
embrassant le plus de substance possible;
les mésentères étoit entrés bon état, dès le
même jour huit heures après l'opération,
il y fut vue partie des excrémens par
l'anus, qui continua les jours suivants;
le malade ne vivoit dans ce tems, (même
que dans les jours qui suivirent la première
opération) que d'un peu de gelée de viande
prise de quatre en quatre heures, le
11. mars le fil d'archal tomba,
Jeus soin de tenir le ventre très libre
par la continuation des lavemens,
malgré cela il y fut encore pendant
quinze jours une petite portion de
matières stercorales par la plaie qui
restoit par l'anus, même pendant
ce tems quelques vers fort longs, qui
inquiétoient beaucoup; mais après ce
tems les excrémens reprirent entièrement

leurs Cours ordinaires, rien reparut
davantage par la plaie, qui attendu
sa grandeur extérieure ne fut cependant
radicallement guérie que le 22. avril
dernier.

Il est très peu d'exemples de
guérison radicale de ce genre, près de
neuf pouces du canal intestinal emporté
dans les deux opérations, la gouverture
faisant des progrès que j'eus bien peine
à combattre; Une portion d'intestin
emportée également; Une perte d'humeurs
si Considérable par la plaie, que quoi
que je pansasse trois fois le jour, encore
avois-je peine à ramasser aisement le pus
dans une Cuillère et qui étoit d'un
caractère si âcre, que la grande
portion des tégumens de l'abdomen en
furent longtems Excoriés.

Je crois devoir éclaircir ici un

animé de quelques grains de Sel ammoniac, le Salut de cette malade, j'en aurai à faire à un bon Sujet, la nature m'ayant puissamment secondé, et si je m'étois rendu après la rupture des premiers points, cette femme après avoir langui longtems seroit sans doute périe miserablement par le peu de dispositions dans l'intestin à se reunir à la cicatrice. La gelée de C. de Cerf m'a été d'un Puissant Secours pour combattre le levain de la cacexie gatté dans le Sang et Soutenir le mouvement des ligueurs. J'en ai Souvent Vu de bons effets Sur tout dans les armées, ou l'on est à même de faire Vingt occasions frequentes de faire Usage

Clemery Chirurgien major des camps et armées du Roy et Ancien en Chirurgie à Vienne le Chateau près St. Marcheville

ce 8. Juillet 1770.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE